

EURneffy®

(spray nasal d'adrénaline)

Comment reconnaître une réaction allergique sévère

Utilisez EURneffy dès les premiers signes d'une réaction allergique sévère suite à une exposition à un allergène. Les symptômes possibles peuvent être:

- Démangeaisons cutanées
- Éruption cutanée surélevée (telle qu'urticaire)
- Bouffées de chaleur
- Gonflement des lèvres, de la gorge, de la langue, des mains et des pieds
- Respiration sifflante
- Enrouement
- Essoufflement
- Nausées
- Vomissements
- Crampes d'estomac
- Perte de conscience
- Sentiment d'appréhension
- Rythme cardiaque élevé
- Crises convulsives
- Diarrhée (selles liquides)
- Perte du contrôle de la vessie



N'HÉSITEZ PAS à utiliser le spray car les symptômes peuvent s'aggraver rapidement.


Assurez-vous que votre enfant, votre famille, vos aidants, vos collègues, vos enseignants ou ceux de vos enfants et vous-même sachiez comment et quand utiliser EURneffy.



Conservation et utilisation

Chaque dispositif EURneffy à usage unique contient une dose d'adrénaline et est fourni avec sa notice d'utilisation dans son emballage blister.

Ayez en permanence 2 sprays EURneffy sur vous au cas où une deuxième dose serait nécessaire.



EURneffy ne nécessite pas de précautions particulières de conservation. En cas de congélation accidentelle, le spray nasal ne fonctionnera pas. Laisser le spray nasal décongeler pendant au moins une heure; ne pas utiliser si le contenu est encore congelé ou n'est pas complètement décongelé. La congélation n'affecte pas la durée de conservation du produit.



Veillez à vérifier régulièrement la date de péremption et à remplacer votre EURneffy avant qu'il ne soit périmé.

Guide d'utilisation pour patients et accompagnants


Ce guide pratique vous explique comment réagir en cas de réaction allergique sévère ou de choc anaphylactique. Il est recommandé aux patients et aux aidants de se familiariser avec ce guide afin de pouvoir reconnaître les symptômes d'une réaction allergique et de savoir comment administrer le spray nasal **EURneffy** 2 mg correctement et en toute sécurité.



1. Tenir


Tenez le spray nasal comme illustré. Placez votre pouce sur le fond du piston et un doigt de chaque côté de l'embout.

NE PAS TIRER NI APPUYER sur le piston.
NE PAS TESTER ou PREVAPORISER; chaque spray nasal contient une seule dose.



2. Placer

Insérez l'extrémité du spray nasal dans une narine jusqu'à ce que vos doigts touchent votre nez. Maintenez l'embout droit dans la narine, orienté en direction du front.



3. Presser

Appuyez fermement sur le piston jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que la solution soit pulvérisée dans la narine.

NE PAS INCLINER le spray nasal vers les parois internes ou externes du nez.

Après avoir utilisé EURneffy

Appelez immédiatement une aide médicale d'urgence pour la prise en charge et la surveillance de votre choc anaphylactique et dans le cas où un traitement complémentaire serait nécessaire. Si vous ne pouvez pas appeler vous-même, demandez à quelqu'un de le faire à votre place.

Lors de l'utilisation d'EURneffy

Si nécessaire, le patient peut s'allonger les jambes surélevées. Il doit cependant rester assis s'il éprouve des difficultés à respirer. Si le patient est inconscient, allongez-le sur le côté en position latérale de sécurité pour éviter tout risque d'étouffement. Si les symptômes ne s'améliorent pas, demandez si possible à quelqu'un de rester à vos côtés jusqu'à ce que vous soyez pris en charge par un médecin.

Surveillez l'évolution des symptômes

Si les symptômes s'aggravent ou reviennent après environ 10 minutes, ou en cas d'erreur d'administration, administrer une deuxième dose d'**EURneffy** à l'aide d'un nouveau spray nasal, dans la MÊME narine que la première dose, et demander une aide médicale d'urgence.



Qu'est-ce que EURneffy?

EURneffy est un spray nasal d'adrénaline indiqué chez les adultes et enfants pesant 30 kg ou plus, pour le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères, y compris d'anaphylaxie (réactions allergiques soudaines, sévères et parfois potentiellement mortelles) causées par des piqûres d'insectes, des aliments, des médicaments ou d'autres allergènes (substances responsables d'une allergie). Il peut également être utilisé en cas de choc anaphylactique idiopathique (sans cause identifiée) ou déclenché par l'exercice physique.

Du matériel éducatif sur le spray **EURneffy**, y compris une copie de la notice et du mode d'emploi, est disponible sur le site www.EURneffy.eu ou en scannant le QR code ci-dessous:



Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la brochure. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy ou Division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la santé. Site internet: www.guichet.lu/pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Utilisez EURneffy dès que vous remarquez des symptômes de réaction allergique sévère.